91

La question proposée par L'academie de Chirurgie establie a paris sous la protection du Roy. Estant:

Pourquoi Certaines tumeurs doivent être Extirpées, Et d'autres simplement ouvertes; dans l'une Et l'autre de ces opérations, quels sont les Cas où le Cautere Est préférable à l'instrument tranchant, et les raisons de préférence.

ON Estime, que les tumeurs schirreuses, doivent Etre Extirpées, et non simplement ouvertes; que l'instrument tranchant Est préférable au Cautere, et les raisons de préférence sont que l'opération Est plus seure, plus prompte, et si les douleurs ne sont pas moins vives, Elles sont moins Longues. L'opérateur peut Eviter avec l'instrument tranchant, l'ouverture de vaisseaux Considerables, et il n'emporte que Ce quil veut.

Le Cautere au Contraire, detruit tout ce quil rencontre dans son progrés, difficille a borner, ouvre les grands vaisseaux, ronge les nérfs et tendons.

Si on ouvre simplement un schirre, l'air agissant

anonyme

ARC 13 d. 13 B n° 33

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

sur les humeurs qui forment la tumeur, et qui abondent en acides Corrosifs, ne manqueroit pas de leur donner le branle; et ces humeurs agittées, tant par cette Cause, que par l'usage des Emolliens Supuratifs, qu'on seroit obligé d'employer pour fondre les matières arrêtées: rongeroint les parties qui les Contiennent, et formeroint un Cancer Ulceré le plus Souvent Incurable.

L'extirpation Emportant promptement la tumeur, et mettant l'ulcère qui reste en Estat d'être Consolidé, sans Craindre ces facheuses Suittes, merite la préférence.

Les tumeurs Enkistées formées depuis longtemps doivent être Extirpées, et non Simplement ouvertes. L'instrument tranchant Est préférable au Cautere; et les raisons de préférence sont, que si on ouvre Simplement ces tumeurs, et qu'on n'employe que des détersifs Supuratifs, on ne parviendra pas a la Curation; Le pus Sera toujours de mauvaise Consistance, Les Chairs baveuses, le Kiste S'oposera a la

reünion des parois de Lulcére, et jl restéra aprés
de Longs pansements, un ulcére fistuleux.
que si aprés louverture de la tumeur on scarifié
Le Kiste, et Employe des détersifs Corrosifs pour
le Consommer, ainsy que le bouton qui est á
sa baze; quoi que Cette Voije reüssisse quelque
fois, jl en arrive d'ordinaire de trés facheux
accidents, Comme doulleurs Jnsupportables, délirée,
Convulsions, nausées, Vomissements, qui Exposent la
Vie du malade, léquel aprés avoir Souffert Ces
Cruëlles doulleurs nen Est pas plus avancée; sil
arrive que le bouton quï est au fond de Lulcére,
ainsy que le Kiste qui en fait la Circonférence,
náyent pas Eté Entiérement Consommés.
Lextirpation Emporte dans peu la tumeur, nest
pas Exposée aux facheux accidents qui
accompagnent Lúsage des Corrosifs. mét

Lulcere a decouvert, et la voye de guerison. merite la préférence.

Les tumeurs Enkistées Nouvellement formées, doivent être simplement ouvertes, et non extirpées: — Linstrument tranchant est préférable au Cautere. Les raisons de préférence sont que lextirpation dune tumeur est toujours plus longue, et plus douloureuse que la simple ouverture, qui suffit dans Cette occasion; la molesse du Kiste et du bouton qui les forment, les faisant tomber par la Suppuration, et de la suit linutilité du Cautere, dont laction est toujours Longue, douloureuse, et souvent accompagnée de tres facheux accidents.

Les Charbons soit simples, soit pestilentiels, — doivent être extirpés, et non simplement — ouverts. le Cautere est préférable a —

Linstrument tranchant. les raisons de préférence
sont que la Simple ouvértûre séroit inutile, —
sagissant Essentiellement Demportér Lescarre qui
En fait la baze: si on veut y parvénir En le
Cérnant tout=autour, on Exposéra le malade á
des doulleurs longues Et trés Cruélles.

Le Cautere Comme le beurre Dantimoine dont
on fait un Cércle autour du Charbon produit
Cet Effect, dans trés peu de temps, faisant —
tombér Lescarre Sans Exposer á des doulleurs.
Considerables, ni autres facheux accidents, doit
avoir La préférence.

Les tumeurs scrophuleuses, doivent être simplement
ouvertes, et Non Extirpées: Linstrument tranchant
Est préférable au Cautere, et les raisons de
préférence sont quon doit Conservér autant
quil Est possible les glandes ou Lassis de

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Vaisseaux ou elles ont dordinaire leurs Sieges, Ces
parties Estant nécéssaires pour Separér Les
humeurs Vitiées de la masse du sang, et dont
La réteniie innondant les parties Internes pourrois
occasionner de trés dangereuses Suittes. Ce que
L'instrument tranchant fait mieux que le Cautere,
Et Lextirpation, dont le propre Est de détruire,
Consommer, Et Emporter toute la partie affectée.
Les apostemes ou abcés, Comme Le phlegmon,
doivent être Simplement ouverts, et non Extirpés:
L'instrument tranchant est préférable au Cautere.
Et les raisons de préférence sont, que les matières
qui forment Ces tumeurs n'étant pas Enférmées
dans des Kistes, léxtirpation toujours Longue
Et doulleureuse, Serois dangereuse Et Inutile:
La partie affectée Estant dordinaire fort tendüe
Et trés Sensible, L'impréssion du Cautére

occasionneroit les memes accidens, dont nous avons parlé au sujet des tumeurs schirreuses la enkistées.

L'ouverture par l'instrument tranchant, ce faisant plus promptement, plus seurement, et avec moins de doulleur, merite la preférence.

Ce que nous venons de dire au sujet des abcés, peut etre apliqué aux panaris, bubons veneriens, et pestilentiels. finis.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Vaisseaux ou Elles ont dordinaire leurs Siege, Ces
parties Estant nécessaires pour Separér Les
humeurs Vitiées de la masse du sang, et dont
La retenüe Innondant les parties Internes pourroit
occasionner de trés dangereuses Suittes. Ce que
Linstrument tranchant fait mieux que le Cautere,
Et Lextirpation, dont le propre Est de détruire,
Consommer, Et Emporter toute la partie affectée.
Les apostemes ou abcés, Comme Le phlegmon,
doivent être Simplement ouverts, et non Extirpés:
Linstrument tranchant est préférable au Cautere.
Et les raisons de préférence sont, que les matières
qui forment Ces tumeurs n'étant pas Enfermées
dans des kistes, léxtirpation toujours Longue
Et doulleureuse, Seroit dangereuse Et Inutille:
La partie affectée Estant dordinaire fort tendüe
Et trés Sensible, Limpression du Cautère

occasionneront les memes accidens, dont nous avons parlé au sujet des tumeurs schirreuses la Enkistées.

L'ouverture par l'instrument tranchant, ce faisant plus promptement, plus sûrement, et avec moins de doulleur, merite la préférence.

Ce que nous venons de dire au sujet des abcès, peut etre apliqué aux panaris, — bubons veneriens, Et pestilentiels. finis.

D+++++

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE